

## **Wat kan u verwachten na een wortelkanaalbehandeling?**

Hoewel de zenuw uit de tand verwijderd is kunnen de weefsels rond de tand ( ligament, kaaksbeen) nog geïrriteerd zijn. Dit verklaart waarom enige dagen napijn kan optreden. Het wordt voornamelijk gevoeld bij aanraking van de tanden en bij het dichtbijten . Meestal duurt de nalast een zevental dagen. Bij grote ontstekingen kan het herstel nog enkele dagen langer duren.

Om de nalast te onderdrukken, kan u een pijnstillertje of ontstekingsremmer nemen. Doorgaans is medicatie op basis van paracetamol of ibuprofen hiervoor geschikt en vrij verkrijgbaar. Lees toch even de bijsluiter na en vraag raad aan uw tandarts bij twijfel. Ook indien er zwelling optreedt is het beter contact op te nemen met de tandarts

### **Voorzichtig zijn**

De verdoving zal nog enkele uren aanhouden. Tot die tijd kunt u best oppassen bij het gebruik van warm eten of drinken. Pas ook op voor het bijten op uw gevoelloze lip, tong of wang. De tijdelijke vulling heeft na de behandeling minimum een uur nodig om extra uit te harden. Wij raden daarom aan om te wachten met eten.

### **Soms is er nog een extra afspraak nodig**

In dat geval is het aan te raden de tand zo min mogelijk te belasten. Hiermee voorkomt u dat de verzwakte tand wordt stukgebeten. Het tijdelijke vullingsmateriaal kan af en toe wat afbrokkelen. Hierover hoeft u zich geen zorgen te maken. Als u écht het idee heeft dat de tijdelijke vulling niet meer afsluit, neem u dan contact op met de tandarts.

### **Na de behandeling**

Als de tand is afgewerkt adviseren we om toch nog enkele dagen voorzichtig te zijn met kauwen, zodat u aan de “nieuwe vorm” van uw tand kan wennen.

**Toch nog vragen? Aarzel dan niet om met ons contact op te nemen!**

**Tandartsen J. Lemaire & Partners**

**Dirk Boutsiaan 6 bus 1**

**3000 Leuven**

**Tel: 016/23 5008**

**Email: jose.lemaire@tandarts.be**